

Formulier van toestemming na voorlichting

Peritoneografie

Het doel van dit formulier is de patiënt in te lichten over de procedure en haar mogelijke complicaties. Dit formulier wil de patiënt niet onnodig angstig maken voor de procedure die bij hem/haar gepland is, doch een beeld geven van de interventie en een aantal mogelijke, doch zeldzame complicaties. De lijst van de vermelde, zeldzame, complicaties is niet limitatief. Voor alle vragen kan de patiënt terecht bij de radioloog via het telefoonnummer: 050/452100 of via de website waarvan het adres hierboven vermeld is. Vóór de procedure zal de patiënt mondeling ingelicht worden door de radioloog en kan hij rechtstreeks terecht bij de radioloog voor alle vragen. De handtekening die van de patiënt gevraagd wordt, is enkel ter bevestiging van zijn/haar toestemming voor de procedure, na degelijk voorgelicht te zijn

Patiëntnaam en i.d. gegevens:

Diagnose of vermoedelijke diagnose bij de patiënt:

Aard van de voorgestelde procedure: Peritoneografie.

Doel van de voorgestelde procedure:

Het opsporen van herniae (breukjes) van het peritoneum (buikvlies) in de buikwand, in de navel, in de lies of in de bekkenbodem.

Procedure verloop:

De patiënt gaat met de rug op de Röntgentafel liggen. Er wordt eerst een RX-opname gemaakt vóór de start van het onderzoek. De huid wordt ontsmet op de punctieplaats. De huid op niveau van de punctieplaats wordt lokaal verdoofd.

Er wordt geprikt met een zeer fijne naald op een punt halverwege de navel en de heupkam net lateraal van de rechte buikspier of centraal thv de onderbuik.

De naald wordt stap voor stap dieper gestoken tot de naaldpunt in het buikvlies zit. Met de naald in het buikvlies wordt 100 ml van een niet-ionische contraststof (kleurstof) geïnjecteerd. De naald wordt verwijderd, de huid wordt nogmaals ontsmet en de punctieplaats wordt afgedekt met een pleister.

Er worden Röntgenopnamen gemaakt in buikligging voor en tijdens persen.

Risico's van de procedure:

Bloedingen op de punctieplaats.

Infectie van de punctieplaats en het punctietraject.

Aanprikken van een darm.

Allergische reacties op de contraststof kunnen voorkomen (roodheid en jeuk van de huid, papelvorming op de huid, in zeldzame gevallen ademnood en shock).

Kortstondig flauwvallen als reactie op de prik (vagale reactie).

Chemische peritonitis als reactie op het contrast.

Infectieuze peritonitis.

Gevolgen van procedure:

Het opsporen van of uitsluiten van de oorzaak van de klachten van de patiënt.

Eventuele alternatieven voor de procedure:

Eventuele gevolgen van deze alternatieven:

In de plaatst van de peritoneografie kan men proberen met andere onderzoeksmethoden een buikvlieshernia op te sporen (zoals echografie, CT-scan). Peritoneografie is evenwel een zeer gevoelige onderzoeksmethode voor het opsporen van buikvliesbreuken.

Een alternatief is het uitvoeren van en operatie of kijkoperatie, doch deze methoden zijn invasiever dan een peritoneografie.

Vragen en opmerkingen van de patiënt:

.....

.....

.....

.....

.....

Ondergetekende patiënt verklaart uitvoerig en begrijpbaar door de radioloog te zijn ingelicht over de procedure die bij hem wordt uitgevoerd op

De ondergetekende patiënt verklaart bovendien te zijn ingelicht over alle mogelijke complicaties van deze procedure.

Handtekening patiënt samen met de eigenhandig geschreven tekst “voor akkoord” en eigenhandig geschreven naam.