

## **Formulier van toestemming na voorlichting**

### **Myelografie**

Het doel van dit formulier is de patiënt in te lichten over de procedure en haar mogelijke complicaties. Dit formulier wil de patiënt niet onnodig angstig maken voor de procedure die bij hem/haar gepland is, doch een beeld geven van de interventie en een aantal mogelijke, doch zeldzame complicaties. De lijst van de vermelde, zeldzame, complicaties is niet limitatief. Vóór de procedure zal de patiënt mondeling ingelicht worden door de radioloog en kan hij rechtstreeks terecht bij de radioloog voor alle vragen. De handtekening die van de patiënt gevraagd wordt, is enkel ter bevestiging van zijn/haar toestemming voor de procedure, na degelijk voorgelicht te zijn

**Patiëntnaam en i.d. gegevens:**

**Diagnose of vermoedelijke diagnose bij de patiënt:**

**Aard van de voorgestelde procedure:**  
Myelografie.

**Doel van de voorgestelde procedure:**  
Beoordeling van het ruggenmergkanaal en zenuwwortels vaak na rugoperaties.

**Procedure verloop:**

De patiënt gaat met de zijde tegen de Röntgentafel zitten, de rug opgebold naar achter. Er wordt eerst een RX-opname gemaakt vóór de start van het onderzoek.

De huid wordt ontsmet op de punctieplaats. De huid op niveau van de punctieplaats wordt lokaal verdoofd.

Er wordt geprikt met een fijne naald op niveau van de tussenwervelruimte L4-L5 of L3-L4 (de ruimte tussen de achteruitsteeksels van deze onderste lumbale wervels).

De naald wordt stap voor stap verder gestoken tot de naaldpunt in het ruggenmergzakje zit. Er wordt eerst wat cerebrospinaal vocht (vocht dat zich in het ruggenmergzakje bevindt) via de naald in een buisje opgevangen (dit vocht kan microscopisch onderzocht worden). Nadien wordt er 10 tot 12 ml van een niet-ionische contraststof (kleurstof) in het ruggenmergzakje ingespoten.

De naald wordt verwijderd, de huid wordt nogmaals ontsmet en de punctieplaats wordt afgedekt met een pleister.

Er worden Röntgenopnamen gemaakt in buikligging, in zijligging en schuin naar links en rechts gedraaid.

Meestal wordt in aansluiting aan de myelografie een CT-scan van de rug uitgevoerd.

**Risico's van de procedure:**

Bloedingen op de punctieplaats.

Infectie van de punctieplaats en het punctietraject.

Aanprikken van een zenuw met zenuwirritatie tot gevolg.

Fistel tussen het ruggenmergzakje en de huid.

Allergische reacties op de contraststof kunnen voorkomen (roodheid en jeuk van de huid, papelvorming op de huid, in zeldzame gevallen ademnood en shock).

Hoofdpijn.

Kortstondig flauwvallen als reactie op de prik (vagale reactie).

Meningitis.

**Gevolgen van procedure:**

Het opsporen van of uitsluiten van de oorzaak van de (persisterende) rugpijnklachten van de patiënt.

**Eventuele alternatieven voor de procedure:**

**Eventuele gevolgen van deze alternatieven:**

Alternatieven voor het opsporen van rugpathologie zijn een CT-scan of een MRI-scan.

Deze onderzoeksmethoden vergen geen prik in de rug en zijn dus minder risicovol dan een myelografie.

Toch kan in sommige gevallen de myelografie de enige onderzoeksmethode zijn die lokale druk op een zenuwwortel opspoort.

**Vragen en opmerkingen van de patiënt:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ondergetekende patiënt verklaart uitvoerig en begrijpbaar door de radioloog te zijn ingelicht over de procedure die bij hem wordt uitgevoerd op  
De ondergetekende patiënt verklaart bovendien te zijn ingelicht over alle mogelijke complicaties van deze procedure.

Handtekening patiënt samen met de eigenhandig geschreven tekst “voor akkoord” en  
eigenhandig geschreven naam.